

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA CUIDADOSAMENTE O ROTULO

TOBRALIN 36% EC

TOBRALIN 36% EC

TOBRALIN 36% EC

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este pesticida envenena através da pele
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato-macaco, botas de borracha, luvas, máscara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes e abelhas.
- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguros e numa área fresca e seca com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período longo.
- Embalagens vazias, depois da tripla lavagem, devem ser enterradas em lugar seguro segundo a legislação em vigor no país.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Fraqueza, dores de cabeça, aperto do peito, visão turva, pupilas não reactivas, salivacão abundante, suores, náuseas, vômitos, diarreias e cólicas abdominais.

PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água, tire a roupa se estiver suja com pesticida. Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita água durante 10 minutos. Se o produto for engolido, não induza o vômito. Colocar o paciente ao ar livre para repouso e dar um copo de água contendo uma alta dosagem de carvão em pó. Em caso de envenenamento chame o médico e mostre-lhe este rótulo.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO:

(Informações para medico):

Não há tratamento específico. Fazer tratamento sintomático

PERIODO DE ESPERA PARA PRÓXIMA CULTURA:

Não fazer outras culturas, pelo menos, nos próximos 3 meses.



SUBSTANCIA ACTIVA

BUTRALIN 360 g/L

Herbicida sistémico local agente controlador de rebentos no Tabaco

CONCENTRADO PARA EMULSÃO (EC)

No REGISTO
DSV – 847

VOLUME NETO:



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote:
Data de Fabrico:
Usar antes de:

Distribuidor:



AgriFocus Limitada
Av. das Industrias
Parcela 409
Tel. + 258 21 752202/3
Fax. + 258 21 752204
Machava- Moçambique

Fabricante:



UPL South Africa (Pty) Ltd
7 Sunbury Office Park,
Douglas Saunders Drive,
La Lucia Ridge, 4019
South Africa

INSTRUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

PERIODO PARA RE-ENTRADA NO CAMPO:

Após a aplicação não entre na área tratada até que a área esteja seca a menos que esteja devidamente equipado.

DOSAGEM **NUNCA EXCEDER A DOSE RECOMENDADA**

CULTURA	DOSE	OBSERVAÇÕES
TABACO Controle de Rebentos	1,5 L/100 L de água	Aplicar manualmente com uma medida a mistura no topo da planta de tabaco de forma a permitir o escoamento para níveis baixos sem acumular no solo. A dosagem deve ser de 10 ml por planta. Contudo, dependendo do tamanho e morfologia da planta a dose pode ser maior ou menor. Remova todos os rebentos que excedam 3 cm antes da aplicação. Chuva dentro de uma hora ou mais após a aplicação não reduzirá a eficácia do produto. Para melhores resultados junte 25 ml de aderente por 100L de mistura.

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária e agitar, juntar a quantidade de produto a utilizar e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no pulverizador. Completar o volume de água, agitando sempre.

COMPATIBILIDADE:

Evitar embalagens standard de polietilenos e latas revestidas com verniz porque pode ocorrer corrosão.

NATUREZA DO RISCO:

Apesar deste produto ter sido extensamente testado em várias condições, o fabricante não garante que seja eficaz sob todas as condições porque a linha de acção e efeito podem ser afectados por factores climáticos e condições de armazenamento, qualidade de água usada para a diluição, compatibilidade com outras substâncias não indicadas no rótulo como também pelo método, tempo e precisão de aplicação. O fabricante não aceita responsabilidade por danos nas culturas, vegetação, ou meio ambiente, animais e humanos ou por falta de desempenho do produto devido a falha do usuário em seguir as instruções do rótulo ou pela ocorrência de condições que não poderiam ter sido previstas na altura do registo. consulte o fornecedor no caso de qualquer dúvida.

